EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

72,896

# MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

LIBRARY
MUS. COMP. ZOÖLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

TRENTE-QUATRIÈME FASCICULE

(10 octobre 1921)

PAR

**MAURICE PIC**

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
OFFICIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS

MOULINS
" LES IMPRIMERIES RÉUNIES "
15, RUE D'ENGHIEN, 15

1921

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOÖLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

# *Nouveautés diverses*[1]

**Trycherus maculatus** n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, rufescens, antennis, pedibus pro parte elytrisque nigris, his postice irregulariter luteo annulatis. Long. 10 mill. Congo. — A placer près de *josephus* Duv.

Le *T. lateralis* mihi, du Congo, a les élytres plus ovalaires avec un dessin différent fait d'une macule antérieure ondulée et d'une macule apicale externe sub-triangulaire jaunes, presque jointes latéralement.

**Eugonius luteomaculatus** n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, niger, elytris antice et postice breve luteo undulato-fasciatis. Long. 12 mill. Yunnan. — A placer près de *gratus* Gorh., fascies des élytres jaunes et différentes.

**Encymon mediojunctus** n. sp. Subovatus, convexus, niger, elytris antice et postice luteo arcuato-maculatis, maculis in disco junctis. Long. 9 mill. Yunnan. — A placer près de *regalis* Gorh., très distinct par ses dessins élytraux particuliers.

**Ancylopus lineatus** n. sp. Elongatus, subparallelus, parum nitidus, niger, capite antice thoraceque lateraliter rufis, elytris in disco rufo lineatis, apice rufo notatis. Long. 7 mill. Fort Crampel. — A placer près de *bivittatus* Per.

**A. grandis** n. sp. Satis elongatus, postice paulo dila-

(1) Comme dans le précédent fascicule, je désigne seulement par la première lettre du genre, les espèces du même genre qui suivent celle décrite la première. Les nouveautés décrites sans indications spéciales sont de ma collection.

tatus, nitidus, rufus, membris plus minusve rufo-piceis, elytris piceis, antice et externe late (humeris piceo maculatis) et postice in disco luteonotatis. Long. 7 mill. Fort Crampel. — Peut se placer près de *graphicus* Gorh.

**A. atricornis** n. sp. Niger, elytris antice et postice breve luteo undulato-fasciatis. Long. 6 mill. Tonkin. — Par sa forme, voisin du précédent, mais membres plus foncés, élytres à dessins différents.

**Danae rufescens** n. sp. Rufescens, minute punctatus, nitidus luteo pubescens. Long. 3 mill. Dahomey. — Voisin de *rufula* Reiche et distinct, à première vue, par le prothorax plus étroit que les élytres et à côtés presque droits.

**D. sibutensis** n. sp. Rufus, antennis nigris, articulo 1° rufo, 9° valde dilatato; nitidus, minute punctatus et luteo pubescens. Long. 4,5 mill. Fort Sibut. — A placer près de *bulfifera* Weise.

**Stenotarsus convexus** n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, irregulariter punctatus, rufus, antennis articulis tribus ultimus nigris; elytris valde convexis; thorace lateraliter regulariter sulcato. Long. 7 mill. Madagascar. — Peut se placer près de *striatocollis* Frm.

**Endomychus atripes** n. sp. Parum elongatus, antice paulo attenuatus, minute punctatus, nitidus, niger, supra rufus, capite antice nigro. Long. 5-5,5 mill. Thibet. — A placer près de *bicolor* Gorh.

**Platyauchenia 5-maculata** n. sp. Oblongo-ovatus, flavus, antennis, geniculis, tarsis scutelloque nigris, thorace in medio et elytris antice et postice late nigro-metallico maculatis, his lateraliter nigro cinctis. Long. 17 mill. Brésil. — A placer près de *Deyrollei* Baly.

**Pachnephorus lineatus** n. sp. Oblongus, niger, vage ænescens, antennis ad basin, tibiis tarsisque rufis, sparse luteo piloso-squamulatus, elytris sat regulariter lineato piloso-squamulatis. Long. 2-3 mill. Afrique Or.

— Espèce très distincte par la disposition de son revêtement.

**P. latior** n. sp. Oblongus, supra æneus, infra pedibusque metallicis, fortiter punctatus, sparse griseo-piloso-squamulatus, elytris antice parum impressis. Long. 3 mill. Madagascar. — Plus robuste que le précédent et à revêtement pileux différent.

**P. curtus** n. sp. Subovatus, æneo-viridescens, antennis pedibusque rufis, elytris fortiter pro parte oblique lineato-punctatis, irregulariter griseo squamulatis. Long. 3 mill. Chine. — A placer près de *seriatus* Lef.

Le *P. rufipennis* mihi, de Hanoi, est également court et large, il est roussâtre en dessus et présente des mouchetures maculiformes blanches et des bandes squamuliformes, en partie composées de squamules fauves avec une ponctuation moins forte.

**P. Anceyi** n. sp. Subovatus, piceo-æneus, thorace antice et sutura pro parte cœruleis, infra viridescens, membris rufis; elytris diverse griseo maculatis, striato-punctatis. Long. 2,5 mill. Singapore. — A placer près de *variegatus* Lef.

**Pseudopolemius** n. g. Antennis subfiliformibus; capite lato, oculis satis minutis; thorace breve, lateraliter sinuato; unguiculis pro parte fissis. Voisin de *Discodon* Gorh. avec les yeux plus éloignés du bord postérieur de la tête, le prothorax très transversal, etc.

**Pseudopolemius bipartitus** n. sp. Oblongus, fere opacus, niger, capite infra aut antice, thorace lateraliter (aliquot rufo: var. *ruficollis*), elytris ad basin late (aliquot rufis: var. *inapicalis*), coxis et femoribus ab basin rufo-testaceis. Long. 11-12 mill. Java.

**P. subelongatus** n. sp. Oblongo-elongatus, testaceus, capite pro parte, antennis, pedibus pro majore parte, pectore abdomineque nigris. Long. 10 mill. Java. — Moins large que le précédent avec l'écusson roux, le prothorax assez fortement échancré au milieu.

**P. atripennis** n. sp. Subparallelus, niger, capite rufo-notato, infra testaceo, thorace rufo-testaceo, humeris breve rufo-notatis. Long. 12 mill. Java.

**Cantharis pooana** n. sp. Elongatus, testaceus, antennis pro majore parte nigris, elytris piceis, griseo pubescentibus; thorace subquadrato, antice triimpresso. Long. 9 mill. Kaschmir. — A placer près de *semiopaca* Pic.

**C. kiontochanana** n. sp. Angustatus, subopacus, pilosus, niger, thorace testaceo, obconico. Long. 10 mill. Chine. — Voisin de *subarcuatipes* Pic.

**C. lineolata** n. sp. Angustatus, nitidus, niger, thorace, scutello elytrisque rufis, vertice rufo lineato; thorace antice subarcuato. Long. 12 mill. Indes. — A placer près de *subnitida* Pic.

**C. orientalis v. nov. subrufohumeralis.** Rufus, antennis pro majore parte, tarsis, elytrisque nigris, his infra humeros rufo notatis. Chine.

**Rhagonycha malthinoides** n. sp. Minutus, elongatus, nitidus, niger, capite antice, coxis, geniculis, scutello thoraceque testaceis, illo in disco piceo maculato, subquadrato; sulcato; elytris nigro metallicis, rugulosis. Long. 5 mill. Indes. — Espèce très distincte par son faciès et sa petite taille.

**R. minima** n. sp. Minutus, elongatus, nitidus, capite, thorace, coxis geniculisque testaceis. Long. 5 mill. Indes. — Avant-corps plus robuste que chez le précédent et autrement coloré.

**Lycocerus notaticollis** n. sp. Elongatus, niger, thorace, illo in disco nigro notato, elytrisque testaceis. Long. 11-12 mill. Chine. — A placer près de *limbatus* Pic.

**L. hirsutus** n. sp. Elongatus, niger, thorace, illo in disco nigro notato, elytrisque purpureis, pedibus pro parte rufis. Long. 14 mill. Chine. — Voisin du précé-

dent, mais revêtement pourpré et élytres ornés de poils dressés clairs.

Le *thibetanus* mihi, du Thibet, ressemble au précédent par sa coloration, mais il n'a pas de poils dressés sur les élytres; quant au *Yunnanus* (Frm.), il offre une coloration générale testacée avec la tête et les antennes un peu rembrunies.

**L. curticollis** n. sp. Elongatus, niger, capite pro parte, thorace elytrisque purpureis; thorace breve, antice attenuato; elytris distincte costatis. Long. 12 mill. Chine. — A placer près de *pubicollis* Pic.

**L. maculaticeps** n. sp. Elongatus, fere parallelus, niger, capite rubro, inter oculos nigro maculato et post oculos nigro notato, thorace pro majore parte elytrisque purpureis; thorace obconico. Long. 10 mill. Darjeeling. — A placer près de *Cordieri* Pic.

**L. trilineatus** n. sp. Angustatus, niger, pedibus rufo tinctis, capite rufo, nigro-maculato, thorace testaceo, medio et lateraliter nigro-lineato, elytris testaceis; thorace elongato, antice attenuato. Long. 10 mill. Indes. — Voisin de *L. decipiens* Gorh.

Très voisin de celui-ci est *L. elongatus* mihi, de Chine, qui est foncé avec le prothorax et les élytres testacés et a un prothorax plus court.

**L. indicus** n. sp. Elongatus, subparallelus, testaceus, capite postice, antennis (ad basin rufis), scutello, infra corpore tarsisque piceis; thorace parum breve, antice mediocre attenuato. Long. 12 mill. Indes. — Voisin de *caliginosus* Gorh.

**L. parallelicollis** n. sp. Angustatus, niger, capite lateraliter rufo, in medio nigro; thorace satis elongato, subparallelo, testaceo, in medio sulcato et nigro lineato; elytris testaceis, costatis; pedibus pro parte rufis. Long. 7 mill. Chine. — A placer près de *lineaticeps* Pic.

**L. lyciformis v. nov. mimolycus.** Elongatus, niger,

elytris rubris, postice late nigris, thorace parum distincte rufo notato. Sumatra (coll. Corporaal). — En outre de la coloration du prothorax, semble différer de la forme type par cet organe assez relevé en avant, les antennes plus courtes et plus larges.

**L. javanus,** de Java, est assez robuste, noir, avec parties postérieures de la tête, le prothorax et le rebord antérieur des élytres testacés.

**Laemoglyptus rianganus** n. sp. Oblongus, nitidus, niger, pro parte infra et in pedibus rufo tinctis, thorace scutelloque testaceis, elytris pallidis, apice subobscuratis. Long. 4 mill. Sumatra. — Ressemble à *discoidalis* var. *rufithorax* mihi dont le prothorax aussi est concolore, mais prothorax à lobe non incisé, impressionné.

**L. angustior** n. sp. ♂. Elongatus, angustatus, nitidus, niger, pro parte brunnescens, thorace rufo, lateraliter testaceo, in medio longe lobato et minute inciso. Long. 6 mill. Java. — Forme plus allongée que *discoidalis* Pic, avec les antennes plus grêles.

**L. robustior** n. sp. ♂. Parum elongatus, nigro-piceus, elytris metallicis, thorace testaceo. Long. 6 mill. Java. — Moins allongé que le précédent avec le lobe du prothorax plus robuste.

**L. flavicollis** (Fairm.). ♂ Oblongo-elongatus, nitidus, nigro-piceus, capite antice late, antennis ad basin, thorace pedibusque pro majore parte rufis. Long. 5,5 mill. Tonkin. — Voisin de *fissiventris* Frm., mais tête largement rousse, prothorax concolore, etc.

**L. Bonfordii** (Frm.). Elongatus, nitidus, capite rubro, thorace geniculisque rufis; thorace lateraliter minute ♀, aut valde lobato et dentato ♂. Long. 7 mill. Indes. — A placer près du précédent.

**L. elongatus v. nov. innotatus.** Thorace testaceo, immaculato. Indes.

**L. vicinus** n. sp. Oblongo-elongatus, nigro-piceus,

elytris metallicis, pedibus pro parte thoraceque testaceis, illo postice fortiter lobato et valde inciso. Long. 6 mill. Indes. — Voisinde *elongatus* Pic, lobe du prothorax différent ♂.

**L. postangulatus** n. sp. ♂. Oblongo-elongatus, nigro-piceus, capite antice, pedibus et abdomine pro parte rufis, thorace rufo, in disco nigro notato, transverso, postice breve lobato et uncato-dentato. Long. 6 mill. Indes. — Particulier par sa structure prothoracique. La ♀ peu caractérisée a simplement le prothorax faiblement échancré près de la base avec l'angle postérieur un peu saillant.

**L. bispinosus** n. sp. Coloration analogue au précédent avec le prothorax plus largement foncé au milieu, mais prothorax différent, prolongé en arrière en un lobe spiniforme émoussé, flanqué d'une longue épine. Long. 7 mill. Indes.

**L. grandis** n. sp. Parum elongatus, testaceus, antennis (ad basin testaceis), pectore et abdomine nigris, elytris piceis, ad basin rufescentibus; thorace lateraliter ♂ late lobato-inciso, in ♀ postice valde dilatato-gibboso. La var. *atripes* a la tête et les pattes foncées. Long. 8 mill. Formose.

**L. singularis** n. sp. ♂. Oblongo-elongatus, niger, pedibus abdomineque pro parte rufis, thorace deplanato, inæquale, ad medium truncato-dilatato et postice distincte inciso. Long. 6 mill. Malabar. — Espèce très distincte par la particulière sculpture de son prothorax.

**Drilosilis nodosus** n. sp. ♂. Satis robustus, niger, capite antice et thorace lateraliter rufis; antennis satis validis; thorace breve, postice fortiter dilatato-noduloso et mediocre inciso. Long. 5 mill. Malacca. — Très distinct par son prothorax.

**D. javanus** n. sp. Elongatus, niger, pedibus abdomineque pro parte rufis, elytris testaceis, postice infuscatus. Long. 6 mill. Java. — A placer près de *borneensis* Pic.

**D. rufonotatus** n. sp. Parum elongatus, subnitidus, niger, thorace rufo-notato. Long. 6 mill. Bornéo. — Voisin de *mentaweiensis* Pic.

**D. opacus** n. sp. ♂. Elongatus, opacus, niger, elytris rufo tinctis; antennis parum gracilibus; thorace breve, postice fortiter lobato et impresso. Long. 6 mill. Ile Banguey.

**D. carinatus** n. sp. ♀. Oblongus, nitidus, niger, capite, thorace et abdomine pro parte rufis; capite breve, antice carinato; thorace transverso, lateraliter postice subsinuato. Long. 7 mill. Laos. — Très voisin de *rubrithorax* Pic, mais tête carénée en avant et angles postérieurs du prothorax émoussés.

**Silesinus n. gen.** Antennis crassis, apice attenuatis, articulo 7 paulo crasso, foveato et arcuato; thorace sinuato, lateraliter excavato, angulis posticis priminulis. — Voisin de *Rambesilis* Pic.

**Silesinus apicicornis** n. sp. Elongatus, supra testaceus, infra pedibusque pro parte piceis, antennis nigris, articulo 1° infra testaceo, ultimo testaceo. Long. 7 mill. Malacca.

**Silis postlobata** n. sp. ♂. Oblongus, niger, capite antice, antennis ad basin, thorace pedibusque pro parte rufis; thorace breve, lateraliter marginato, postice et lateraliter sat longe et late lobato. Long. 6 mill. Bornéo. — Voisin de *telephoroides* Pic.

**S. brastagiana** n. sp. ♀. Elongatus, nitidus, testaceus, antennis (ad basin rufis), pectore pro parte, abdomine tarsisque nigris, elytris piceis, antice late testaceis; thorace breve, postice parum inciso, angulis posticis prominulis. Long. 4 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Peut se placer près de *discoidalis* Pic.

**S. subatra** n. sp. ♀. Elongatus, nitidus, testaceus, infra corpore pro majore parte nigro; capite lato; antennis filiformibus; thorace subquadrato, lateraliter sinuato, angulis posticis prominulis, antice truncato, in

disco sulcato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, griseo-pubescentibus. Long. 5 mill. Sumatra (coll. Corporaal). — Le dessous du corps foncé le distingue, à première vue, des autres espèces testacées.

**S. incarinata** n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, antennis satis validis; thorace satis robusto, postice lateraliter bidentato ♂, aut plicato ♀ ; elytris thorace paulo latioribus, ruguloso-punctatis, in disco subcostulatis. Long. 8-9 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). A placer près de *simplex* Gorh.

**S. robustior** (? v. de *simplex*). Robustus, testaceus, nitidus, antennis filiformibus; thorace lateraliter sinuato; antice tuberculato, postice breve inciso, angulis posticis prominulis. Long. 9 mill. Sumatra. — Diffère nettement du précédent, par les antennes plus grêles et la forme du prothorax.

**S. pauloincisa** n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, antennis filiformibus; thorace lateraliter sinuato, antice et postice minute circumciso. Long. 7-8 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Voisin de *pallidicolor* Pic.

**S. Corporaali** n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, antennis filiformibus, articulo 1° sulcato; thorace subquadrato, lateraliter subarcuato-sinuato, postice longe impresso in mare; elytris thorace paulo sat latioribus, ruguloso-punctatis. Long. 6-7 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Voisin du précédent.

Le *S. subrecticollis* mihi, de la même origine, très voisin du précédent, a le prothorax un peu plus large et le premier article des antennes non sillonné longitudinalement.

**S. sulcaticornis** n. sp. ♂. Elongatus, nitidus, testaceus, antennis filiformibus, articulo 1° sulcato; thorace parum transverso, lateraliter sinuato, postice impresso; elytris thorace paulo latioribus, ruguloso-punctatis. Long. 7 mill. Sumatra. — Voisin du précédent, prothorax différent.

**S. notaticornis** n. sp. Testaceus, antennis particularibus. Long. 7 mill. Sumatra (Coll. Corporaal et Pic). — Espèce distincte, à première vue, par la structure de ses antennes qui, en étant filiformes, avec le 1er article sillonné, ont les articles 4 à 7 munis, en dessus, d'une plaque déprimée mate.

**Microichthyurus albonotatus** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris violaceis, apice albo notatis, antennis ad basin abdomineque pro parte testaceis, coxis albidis. Long. 4 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Espèce très particulière par sa coloration.

**M. excavaticeps** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris piceis, apice testaceis, antennis ad basin, abdomine pro parte pedibusque pro majore parte testaceis, tibiis apice tarsisque nigris, femoribus supra nigro notatis; pygidio robusto, apice late lunato. Long. 6 mill. Sumatra (coll. Corporaal). — A placer près de *robustus* Pic.

**M. cephalotes** n. sp. Angustatus, parum nitidus, elytris in disco brunneis, niger, griseo pubescens, infra corpore albo notato, antennis ad basin testaceis; capite maximo; thorace subquadrato, postice attenuato. Long. 4 mill. Sumatra. — Voisin de *atricolor* Pic, ainsi que les suivants.

**M. brevicollis** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris late brunneis, infra corpore testaceo notato, antennis ad basin testaceis; capite excavato; thorace breve, transverso; pygidio elongato et angustato apice lunato et lobato. Long. 5 mill. Java.

**M. Corporaali** n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, elytris apice testaceis, antennis ad basin et infra corpore pro parte testaceis aut albidis; pygidio valido, apice late lunato. Long. 5-5,5 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — La var. *diversus* mihi ♂ a le pygidium peu élargi, plus ou moins fortement échancré et présente en dessous des styles peu arqués.

**M. latopygus** n. sp. Elongatus, nitidus, pro majore parte niger, elytris in disco et abdomine plus minusve brunneo aut rufo tinctis, antennis ad basin testaceis; pygidio lato et robusto, apice valde lunato. Long. 4-5 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — La var. *inobscurus* mihi, de la même origine, a le pygidium médiocrement échancré et présente une coloration en majeure partie brunâtre.

**M. longepygus** n. sp. Pygidio elongato, modice lunato. Analogue au précédent, de forme et coloration, tantôt plus ou moins foncé (forme type), tantôt brunâtre (v. *diversicolor*) et distinct par le pygidium long et peu large, médiocrement échancré, muni en dessous, probablement sexe ♂, de styles arqués. Sumatra.

**M. impressopygus** n. sp. Elongatus, niger, antennis ad basin abdomineque pro parte testaceis; thorace breve; pygidio apice triangulariter inciso, infra longe impresso. Long. 5 mill. Sumatra.

**M. singularicornis** n. sp. Elongatus, niger, elytris in disco brunneo notatis, antennis ad basin testaceis, abdomine pro parte testaceo marginato; capite valido; articulo 8° antennarum dilatato, apice dentato; pygidio valido, apice inciso, infra lobato. Variat pro majore parte brunnescens (v. *differens*) (1). Long. 5 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic).

**Lycus humerospinus** n. sp. Oblongus, ad medium strangulatus, niger, thorace lateraliter et elytris lateraliter luteo notatis, ♂ humeros extus longe spinosis, ♀ arcuatis. Long. 10-12 mill. Afrique Or. : Tandala.— Voisin de *L. Bozazi* Brg., épine humérale plus longue, élytres moins dilatés en arrière, etc.

**L. subdilatatus** n. sp. Elongatus, ante medium strangulatus, apice sat valde dilatatus, niger, thorace late-

(1) Le *diversepygus* mihi de coloration et faciès analogues, dont le pygidium apparaît plus étroit et forme 2 grands lobes rapprochés en dessous n'est sans doute qu'une race de la même espèce. Sumatra.

raliter elytrisque testaceis, his ad scutellum longe nigro notatis, humeris arcuatis, angulis suturalibus acutis. Long. 15 mill. Afrique Or. — Par sa forme, se rapproche de *Boccandei* Brg.

**L. Theresæ** n. sp. Latus ♂, aut elongatus et subparallelus ♀, niger, thorace circa elytrisque testaceis, his ad suturam et apice plus minusve nigris, in disco lateraliter nigro lineatis, ♂ elytris supra excavatis, humeris elevatis, apice longe arcuato spinosis. Long. 12-13 mill. Cameroun. — A placer près de *aculeatus* Brg.

**L. excavatus** n. sp. ♂. Latus, niger, thorace lateraliter, abdomine pro parte elytrisque testaceis, his apice nigro sinuato-marginatis, elytris supra excavatis, humeris elevatis, apice longe arcuato spinosis. Long. 12 mill. Tanganika. — Voisin du précédent, coloration elytrale différente, épine testacée, etc.

**L. deplanatus** n. sp. ♂ valde sat regulariter dilatatus, ♀ parum elongatus et ad medium parum dilatatus, niger, thorace lateraliter elytrisque testaceis, his ad scutellum nigro notatis et apice breve nigro marginatis. Long. 18-20 mill. Cameroun. — Par sa forme particulière, rappelle *Karandeli* Brg. et distinct, à première vue, par ses élytres inermes.

**L. latesuturalis** n. sp. Oblongo-elongatus, niger, thorace et elytris lateraliter late testaceo-limbatis, humeris rotundatis. Long. 20 mill. Congo. — A placer près de *Leveillei* Brg.

**L. jokoensis** n. sp. ♂. Oblongo-elongatus, ad medium strangulatus, niger, thorace, illo in disco nigro maculato, elytrisque testaceis, his ad scutellum brunnescentibus et apice breve nigro marginatis, humeris rotundatis, pedibus validis. Long. 17 mill. Cameroun. — Peut se placer près de *hamulifer* Brg.

**L. telephoroides** n. sp. Elongatus, antice strangulatus, rufo-brunneus, thorace, illo in disco brunneo-notato, elytrisque testaceis, his post scutellum, apice et

lateraliter postice brunneo notatis aut marginatis, costatis, humeris rotundatis; pedibus valde deplanatis. Long. 18 mill. Cameroun. — Espèce très distincte par sa forme.

**Lystronychus undulatus** n. sp. Oblongus, fere opacus, niger, capite thoraceque subæneis, densissime punctatus, elytris nigris, testaceo et sinuato fasciatis. Long. 7 mill. Colombie. — Espèce très distincte par le dessin des élytres fait d'une bande sinuée longitudinale allant de l'épaule à la suture qu'elle longe d'abord et quitte dans la direction du bord après le milieu et émettant une branche médiane transversale; en outre, les élytres sont bordés de testacé postérieurement.

**L. santiagonus** n. sp. Oblongus, subopacus, hirsutus, niger, vage subæneis, elytris post humeros depressis et transverse rufo maculatis ; thorace lateraliter denticulato ; elytris satis brevibus, minute et sparse granulatis. Long. 6 mill. R. Argentine. — A placer près de *impressipennis* Bor.

**L. depressipennis** n. sp. Oblongus, subopacus, hirsutus, niger, vage subæneus, elytris nitidis, æneis, ad basin depressis et gibbosis, irregulariter punctatis; thorace denticulato. Long. 5 mill. R. Argentine. — Espèce très distincte par sa coloration jointe à sa structure élytrale.

**L. nitidipennis** n. sp. Oblongus, hirsutus, nigro-æneus, infra pro parte rufescens, elytris piceo-æneis, nitidis, membris nigris, femoribus late rufis; thorace indenticulato, lateraliter arcuato; elytris fere instriatis, pro parte irregulariter punctatis, antice paulo impressis. Long. 7 mill. Bolivie. — Plus robuste que le précédent, élytres différents, prothorax non denticulé, etc...

**L. argentinus** n. sp. Oblongus, fere opacus, hirsutus, nigro-subæneus, membris nigris ; thorace indenticulato; elytris instriatis, minute lineato-punctatis. Long.

7 mill. R. Argentine. — A placer près de *humeralis* Frm.

**L. Wagneri** n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, hirsutus, nigro-subæneus aut olivaceus, elytris nitidis, piceo-olivaceis aut rufo-ænescentibus, membris plus minusve piceis aut rufescentibus. Long. 7-8 mill. R. Argentine. — Très distinct du précédent par la forme plus allongée, le dessin plus brillant, les élytres plus nettement ponctués, etc...

**L. testaceipes** n. sp. Elongatus, parum nitidus, hirsutus, rufus, pedibus pallidioribus, capite thoraceque pro parte brunneis; thorace indenticulato; elytris substriatis, fortiter sat irregulariter punctatis. Long. 6 mill. Brésil. — Peut se placer près de *Delauneyi* F. Sal.

**Microprostenus n. gen.** Antennis elongatis, articulis 3 et sequentibus elongatis, apice dilatatis; oculis validis, approximatis; pedibus brevibus. — Genre intermédiaire entre *Prostenus* Latr. et *Lystronychus* Latr.

**Microprostenus longicornis** n. sp. Oblongus, subopacus, cœrulescens, thorace elytrisque pro parte rufis, his ad humeros rufo maculatis; thorace lateraliter denticulato; elytris satis brevibus, punctato-lineatis, sparse hirsutis. Long. 7 mill. Brésil.

**Xystropus inhirsutus** n. sp. Oblongus, fere opacus, glaber, olivaceus, elytris piscescentibus, membris cyaneis, femoribus ad basin rufis; thorace lateraliter subarcuato, indenticulato ; elytris substriatis. Long. 7 mill. Brésil. — Peut se placer près de *latipennis* Mak. — La var. n. *latior*, de la R. Argentine, a les élytres foncés, olivâtres, le prothorax plus robuste, les élytres plus larges.

**X. Armitagei** n. sp. Très voisin du précédent, mais bronzé, membres noirs avec les cuisses largement rouges, le prothorax fortement dilaté-arrondi au milieu et les élytres plus nettement striés. Long. 8 mill. Brésil.

Le **X. major** n. sp., du Paraguay, est plus grand que le précédent, de coloration plus obscure, avec le prothorax subarqué sur les côtés, les antennes sont un peu robustes. Long. 10-11 mill.

**X. bicoloripes** n. sp. Oblongus, opacus, hirsutus, cœrulescens, femoribus rufo annulatis; thorace transverso, lateraliter denticulato; elytris satis brevibus, minute lineato-punctatis. Long. 7 mill. Brésil. — Peut se placer près de *X. laniger* Maek.

**Strongylium infossifrons** n. sp. Elongatus, nitidus, postice attenuatus, viridescens, pro parte subæneus, elytris postice purpureo-limbatis, membris pro parte abdomineque rufescentibus; thorace dense punctato, lateraliter minute tuberculato, in disco sulcato; elytris parum regulariter striatis et punctatis, supra pro parte mediocre impressis. Long. 9 mill. Colombie. Reçu du Fr. Apollinaire-Marie, ainsi que les suivants. — Voisin de *fossifrons* M., mais tête sans impression, prothorax non fovéolé, etc.

**S. Apollinairei** n. sp. Elongatus, nitidus, postice attenuatus, supra olivaceus aut viridescens, infra pro parte purpureus, femoribus ad basin rufis aut purpureis; thorace sparse punctato, lateraliter sinuato et tuberculato; elytris minute lineato-punctatis, punctis antice pro parte fortioribus. Long. 18 mill. Colombie. — Voisin de *colombianum* Chp., en diffère par les angles antérieurs du prothorax saillants, les élytres moins atténués en arrière et autrement ponctués, etc.

Le **S. fulvitarse** n. sp. est verdâtre, un peu bronzé sur les élytres, avec le prothorax presque lisse, à angles antérieurs arrondis, les élytres ont des rangées de points espacés plus gros, en avant, les tarses sont plus ou moins villeux de fauve. Long. 13 mill. Colombie.

**S. pilosipes** n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-cœruleus, elytris purpureo tinctis, aliquot viridescentibus; thorace inæquale, fortiter et dense punctato, laterali-

ter minute tuberculato; elytris satis regulariter et inæquale lineato-foveolatis; metasterno pedibusque pro parte pilosis. Long. 15 mill. Colombie. — A placer près de *viridipes* Maek. et distinct, à première vue, par la ponctuation dense du prothorax.

**S. diverseplicatum** n. sp. Oblongus, parum nitidus, fortiter et inequaliter punctatus, pro parte plicatus, plus minusve viridescens aut cyanescens, aliquot pro parte cuprescens; elytris irregulariter et diverse foveolatis et plicatis, in disco elevatis. Long. 13-14 mill. Colombie. — A placer près de *semiopacum* Pic.

**S. posticejunctum** n. sp. Elongatus, viridi-cærulescens, antennis testaceis, elytris antice longitudinaliter testaceo vittatis (vitta presuturalis et lateralis), his postice transverse junctis. Long. 14 mill. Colombie. — Voisin de *luteoangulatum* Pic, mais pattes foncées, élytres plus rétrécis à l'extrémité, à bande présuturale testacée plus longue.

**Antimachus furcifer v. nov. reductus.** Thorace parum profunde inciso, angulis anticis cornutis, apice oblique truncato et tuberculato. Brésil.

**A. punctatus** n. sp. ♂. Elongatus, subparallelus, niger, parum nitidus; thorace antice late et breve inciso, minute cornuto; elytris fortiter lineato punctatis. Long. 11 millimètres, Guyane Française. — Très voisin de *triangulifer* Kirsh., mais ponctuation du prothorax moins dense, celle des élytres plus ronde et moins rapprochée.

**A. nitidus** n. sp. Elongatus, subparallelus, niger, nitidus, thorace antice in mare sat fortiter inciso, sat breve et arcuato cornuto, pro parte sat dense punctato, ♀ antice sinuato; elytris fortiter lineato-punctatis. Long. 22-23 mill. Guyane Française. — Plus brillant que le précédent, avec le prothorax autrement ponctué, la corne de la tête plus longue ♂, etc.

**A. substriatus** n. sp. ♂. Très voisin du précédent,

avec le prothorax très finement, régulièrement et éparsement ponctué, les élytres avec des traces de fines stries reliant en partie les gros points fovéolés. Long. 23 mill. Maroni.

**A. nigerrimus v. nov. Leseleuci.** Thorace lateraliter fere recte et subsinuato, in disco fere læve, antice et postice lateraliter fortiter punctato, angulis anticis thoracis brevibus, apice rotundatis ♂, antice subsinuato ♀. Long. 17 mill. Brésil.

**Dicraeosis impressus** n. sp. Angustatus, niger, palpis, antennis, pedibus pro parte elytrisque rufis, thorace pro parte granulato, elongato, antice attenuato et truncato, supra antice late impresso. Long. 9 mill. Java. — Voisin de *acutus* Geb., sculpture élytrale analogue, mais prothorax bien différent.

**D. conicus** n. sp. Angustatus, nigro-piceus, palpis antennisque rufis; thorace elongato, antice attenuato et conico, diverse punctato-ruguloso. Long. 9 mill. Zanzibar. — Plus foncé que le précédent avec le prothorax terminé en avant par une pointe émoussée conique, un peu inclinée en dessus.

**D. longicornis** n. sp. Elongatus, nigro-piceus, capite antice et antennis ad basin rufescentibus; antennis satis elongatis, apice paulo dilatatis; thorace inæquale parum elongato, subparallelo, antice parum prominulo et in disco antice longe impresso; elytris parum elongatis, costis interruptis aut tuberculis pro parte munitis. Long. 5 mill. Bornéo. — Peut se placer près de *carinatus* Geb., antennes plus longues, angles antérieurs du prothorax non saillants et sculpture différente.

**D. rufescens** n. sp. Satis elongatus, rufescens, capite thoraceque dense punctato-granulatis, illo in disco antice impresso; elytris lineato-punctatis, costis interruptis, aut tuberculis, pro parte munitis. Long. 5 mill. Kina Balu. — Plus étroit que le précédent, coloration plus claire, etc.

**D. costatus** n. sp. Elongatus, niger, elytris brunnescentibus, capite thoraceque dense punctato-granulatis, illo breve, antice subarcuato; elytris costatis, interstitiis fortiter punctatis. Long. 5 mill. Ile Balabac. — Voisin du précédent avec la sculpture différente et les antennes plus courtes.

**Spinadaenus n. gen.** Capite minute; thorace lateraliter multi dentato; elytris lateraliter crenulatis. — Genre surtout remarquable par la singulière structure du prothorax, muni de cinq dents plus ou moins longues, la postérieure large et bifide; intermédiaire entre *Pengalaganus* Pic et *Spinolyprops* Pic.

**Spinadaenus singularis** n. sp. Oblongus, nitidus, fortiter ruguloso punctatus, niger, palpis pedibusque pro parte rufis; capite breve, oculis mediocris; antennis validis, filiformibus; thorace transverso, lateraliter multi inciso et diverse dentato; elytris parum latis, satis brevibus; femoribus paulo dilatatis. Long. 8 mill. Bornéo.

**Tjikoraia** n. gen. Antennis apice dilatatis; capite simplice, epistome indistincte; thorace lateraliter valde deplanato et postice minute marginato; elytris antice marginatis; tibiis anticis parum dilatatis. — Genre à placer provisoirement dans le voisinage de *Alphitophagus* Steph., mais antennes à massue très distincte et prothorax de forme particulière.

**Tjikoraia javana** n. sp. Oblongus, antice et postice attenuatus, nigro-piceus, capite fortiter et irregulariter punctato; thorace subtransverso, postice fere recte, antice parum attenuato, minute et sparse punctato; elytris brevibus, thorace non latioribus, minute lineato-punctatis. Long. 4-5 mill. Java.

Le *T. testacea* mihi, de Java, est testacé, de forme un peu trapue avec le prothorax nettement rétréci à l'extrême base (1).

(1) Je range provisoirement dans le même genre une plus grande espèce (*Simoni*, de Ceylan) de coloration roussâtre, ayant les an-

**Molion ater** n. sp. ♂. Subcylindricus, niger, mandibularum cornibus longis, apice dilatatis et emarginatis, capite incornuto; thorace transverso, sparse punctato; elytris mediocre striato-punctatis. Long. 7 mill. Brésil. — A placer près de *Goudoti* Lac.

**Peneta sinuaticollis** n. sp. ♂. Oblongus, rufescens, capite antice undulato, ad oculos breve et late cornuto; thorace lateraliter subsinuato, antice gibboso et excavato, angulis anticis prominulis; elytris sat fortiter striato-punctatis, interstitiis lævibus. Long. 10 mill. Bolivie. — Voisin de *obtusicornis* Kir., très distinct, à première vue, par le prothorax un peu sinué latéralement.

**P. ulomoides** n. sp. ♂. Oblongus, rufus, capite ad oculos cornu lato et inciso munito, in vertice minute bituberculato; thorace lateraliter subarcuato, antice medio excavato, minute punctato; elytris minute striato-punctatis. Long. 10-11 mill. Vénézuéla. — Diffère du précédent, en outre de la structure de la tête, par la forme moins parallèle, les élytres moins fortement ponctués, etc.

**P. diversicornis** n. sp. ♂. Oblongus, rufus, capite antice subtruncato, ad oculos cornu divaricato, postice prolongo munito, lateraliter denticulato, in medio sulcato; elytris fortiter striato-punctatis. Long. 8 mill. Colombie. — Très distinct par la structure de sa tête et celle du prothorax.

**Micropeneta** n. gen. Antennis apice valde dilatatis; capite antice simplice, deplanato et truncato, ad oculos cornuto; thorace simplice, lateraliter valde marginato, antice minute et sinuato marginato; elytris antice subcrenulatis; tibiis anticis apice dilatatis. — Voisin de *Peneta* Luc., tête de structure différente et for-

---

tennes plus longues et moins épaissies à l'extrémité, le prothorax peu marginé postérieurement et en partie fortement ponctué avec les élytres moins courts.

me du corps rappelant un peu celle d'un *Alphitophagus* Steph.

**Micropeneta testacea** n. sp. Oblongus, postice parum attenuatus, minute et mediocre punctatus; capite ad oculos cornu lato et divaricato munito; thorace transverso; elytris satis brevibus, lineato-punctatis. Long. 4 mill. Sumatra. — Je range, provisoirement, dans ce genre, sous le nom d'*excavatifrons* une autre espèce rousse, de Sumatra, ayant la tête munie d'une corne courte et large, échancrée en dessus, le prothorax subarqué sur les côtés et largement entaillé au milieu antérieurement, la forme moins convexe.

**Macruloma** n. gen. Antennis pro majore parte valde dilatatis; capite antice in mare late dilatato, lateraliter dentato; thorace in mare antice armato; tibiis anticis fortiter denticulatis, posticis lævibus, apice paulo dilatatis.

Genre joignant à un faciès d'*Uloma* L. une structure particulière de la tête chez ♂. Peut se placer près de *Achthosus* Pasc.

**Macruloma gigas** n. sp. Parum elongatus, rufus, capite simplice ♀; thorace transverso, ♂ antice excavato, lateraliter tuberculato, et intus cornu lato et apice arcuate producto munito, simplice ♀; elytris minute striatis. Long. 18-23 mill. Java. — Paraît voisin de *A. antimachoides* Frm., qui semble rentrer dans ce nouveau genre, et dont *gigas mihi* pourrait bien n'être qu'une variété.

**Achthosus sinuaticeps** n. sp. ♂. Parum elongatus, niger, antennis pedibusque rufescentibus; capite simplice, antice valde sinuato-undulato ; thorace antice sat breve et arcuate bicornuto; elytris fortiter striatis. Long. 18 mill. Bornéo. — Peut se placer près de *bihamatus* Frm.

**Asbolodomimus n. gen.** Articulis ultimis antennarum satis elongatis; capite in thorace valde inserto, oculis minutis ; thorace transverso, angulis anticis

valde prominulis ; elytris gibbosis, postice valde inclinatis et attenuatis ; pedibus parum elongatis ; articulo penultimo tarsarum infra prolongato aut sublobato. — A placer près du genre *Asbolodes* Frm. et très distinct, à première vue, par la forme de son prothorax et les épaules non pustuleuses.

**Asbolodomimus subcarinatus** n. sp. Oblongus, parum nitidus, niger, capite thoraceque dense rugulosopunctatis, angulis anticis thoracis prominulis ; elytris ad medium elevatis, antice carinato-tuberculatis et postice fortiter carinatis. Long. 10 mill. Kina-Balu.

**Caracasa n. gen.** Capite parum breve, antennis satis elongatis, apice paulo dilatatis ; thorace sinuato, angulis anticis prominulis, pro parte marginato ; elytris antice strangulatis ; prosterno horizontale, postice parum prominulo ; metasterno valde inciso et tuberculato. — A placer près de *Sycophantes* Kirsch.

**Caracasa æneipennis** n. sp. Oblongo-elongatus, postice dilatatus, niger, elytris æneis, convexis et minute violaceo lineatis, tibiis arcuatis, inermis. Long. 12 mill. Caracas.

**Spinepicalla n. gen.** Capite breve, antennis satis brevibus, subfiliformibus ; thorace breve, marginato ; elytris thorace paulo latioribus, humeris rotundatis, epipleuris antice dilatatis, apice nullis ; pedibus elongatis, tibiis anticis et intermediis intus dentatis ; prosterno postice angulato, metasterno valde inciso. — Ce genre rappelle un peu *Epicalla* Chp. et aussi certains petits Camariens.

**Spinepicalla armata** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, piceus, elytris æneis, minute striatis ; thorace minuto et sparse punctato. Long. 12 mill. Amérique M^le^.

**Pseudoperichilus n. gen.** Corpus paulo deplanatus ; capite breve et lato, oculis minutis et prominulis ; antennis satis gracilibus, subfiliformibus ; thorace trans-

verso, subundulato, angulis anticis fere rectis; elytris marginatis; pedibus parum elongatis, tibiis arcuatis. — Peut se placer près de *Perichilus* Qued.; genre très distinct par ses membres relativement grêles joints à la forme du prothorax.

**Pseudoperichilus olivaceus** n. sp. Oblongus, postice paulo dilatatus, nitidus, olivaceus, capite thoraceque dense punctato-pupillatis, elytris thorace paulo latioribus, parum distincte striatis et minute lineato-punctatis, intervallis subalutaceis. Long. 4,5 mill. Madagascar.

**Foochounus** n. gen. Antennis gracilibus, articulo 3° longissimo; capite parum breve, oculis satis magnis; thorace transverso, lateraliter sinuato, angulis anticis parum prominulis; elytris thorace paulo latioribus, marginatis, ante apicem subsinuatis; pedibus parum brevibus, tarsis simplicibus, elongatis. — Ce genre a un faciès de *Epicalla* Chp. avec les antennes plus grêles, le prothorax à angles antérieurs marqués, etc. Peut se placer près de *Tearchus* Kr.

**Foochounus convexipennis** n. sp. Oblongus, nigropiceus, elytris æneis, pro parte purpureo-lineatis; capite thoraceque fortiter et diverse punctatis; elytris fortiter punctato-striatis; intervallis subconvexis, parum et minute punctatis. Long. 9 mill. Chine.

**Falsogauromaia** n. gen. Capite elongato, antice dilatato; antennis brevibus, apice crassis; thorace elongato; tarsis parum validis, articulo penultimo simplice. — Ce genre, très distinct à première vue par la forme de sa tête, a un faciès de *Gauromaia* Pasc. avec un avant-corps très allongé, mais la forme de son prosternum le rapproche de *Camarimena* Mots.

**Falsogauromaia annulipes** n. sp. Elongatus, postice paulo dilatatus, nitidus, niger, femoribus rufo annulatis; thorace minute et sparse punctato; elytris minutissime striato-punctatis, intervallis deplanatis. Long. 13-15 mill. Kina Balu.

**Celebesa** n. gen. Capite satis breve; antennis apice dilatatis; elytris ad basin breve strangulatis; tarsis parum validis; prosterno inter coxas distincte prominulo. — Genre voisin de *Gauromaia* Pascoe, distinct par ses élytres se rétrécissant nettement en avant et par la forme de son prosternum.

**Celebesa elongata** n. sp. Elongatus, fere opacus, niger, pro parte cupreo-tinctus; thorace minute et sparse punctato; elytris minute striatis, intervallis deplanatis. Long. 12 mill. Célèbes.

Trois autres espèces, également de Célèbes, de taille plus petite et à dessins brillants sont: *angustior*, sur le dessus en partie vert et pourpré avec les élytres plus ou moins bleus, pourprés sur les bords; *latipennis*, à dessus vert avec de vagues reflets pourprés par places, cette dernière espèce se distinguant par la forme plus élargie des élytres et les intervalles déprimés, tandis qu'ils sont subconvexes chez *angustior* ; *purpureus*, étroit et allongé, pourpré ayant quelques reflets verts, avec le dessous et une partie des membres roux.

**Microgauromaia** n. gen. Capite breve, antennis apice dilatatis; elytris ad basin attenuatis, marginatis; tarsis parum validis; prosterno angustato, postice longe prolongato et angulato. — Voisin du genre précédent et de *Gauromaia* Pascoe.

**Microgauromaia minuta** n. sp. Oblongus, nitidus, supra viridis, pro parte purpureo tinctus, infra membrisque plus minusve nigris, aliquot rufescentibus, elytris post medium dilatatis et apice attenuatis, fortiter striato-punctatis, intervallis convexis. Long. 7 mill. Célèbes.

**Oyanus** n. gen. Capite satis breve, antennis brevibus, apice dilatatis; thorace transverso, postice, lateraliter et antice pro parte marginato, lateraliter postice bisinuato; elytris marginatis, foveolatis, ad basin valde marginatis, epipleuris antice valde dilatatis, ante apicem nullis; pedibus elongatis, articulo penultimo tar-

sarum simplice. — Ce nouveau genre peut prendre place près de *Psydus* Pasc.

**Oyanus curticornis** n. sp. Oblongus, nitidus, æneus, capite thoraceque minute et sparse punctatis, elytris thorace paulo latioribus, apice breve attenuatis, irregulariter foveolatis. Long. 12 mill. Ceylan.

**Psydomorphus** n. gen. Caput parum breve, antennis mediocre brevibus, apice paulo dilatatis; thorace transverso, antice et postice in medio non marginato; elytris lateraliter valde marginatis ; pedibus elongatis tibiis anticis intus tuberculatis, articulo penultimo tarsarum simplice. — Voisin de *Psydus* Pascoe, prothorax non complètement rebordé postérieurement et élytres sans fort rebord basal, tibias antérieurs tuberculés, etc.

**Psydomorphus diversipes** n. sp. Oblongo-elongatus, niger, supra vage ænescens, femoribus intermediis et posticis luteo-annulatis; capite thoraceque sat fortiter et sparse punctatis; elytris fere instriatis sed minute lineato-punctatis, intervallis deplanatis, minute punctatis. Long. 12 mill. Chine.

**Dictysomorphus** n. gen. Corpus subovatus; capite breve, antice subarcuato, oculis validis, approximatis; articulis 4 et sequentibus antennarum latis, dentatis; thorace valde transverso, postice immarginato; tarsis anticis parum crassis, articulo penultimo simplice ; prosterno horizontale, postice subarcuato. — Ce genre, voisin de *Hemicera* Cast., se reconnaîtra, à première vue, par son faciès qui rappelle le genre *Amarygmus* Dalm.

**Dictysomorphus dentaticornis** n. sp. Subovatus, parum convexus, nitidus, niger, capite scutelloque cupreo violaceis, thorace cyaneo viridis, sparse punctato, postice ad basin impresso; elytris viridibus, striatis, striis sat fortiter punctatis. Long. 12 mill. Bornéo.

**Espitomorphus** n. gen. Capite sat breve, antennis apice dilatatis; thorace lateraliter carinato; tarsis anti-

cis validis, posticis parum elongatis, articulo ultimo longissimo. — Par la forme de son prosternum se rapproche de *Espites* Pascoe avec un faciès de *Camarimena* Mots. ; diffère, à première vue, du premier genre par les tarses moins épais avec l'article à crochet long et du deuxième par le prothorax nettement caréné sur les côtés et la forme moins allongée du corps.

**Espitomorphus multicolor** n. sp. Oblongo-elongatus, viridi-subæneus, pro parte purpureo tinctus, antennis nigris, pedibus metallicis. Variat aliquot elytris cyaneis : v. *cyaneipennis*. Long. 10-12 mill. Java.

**Lyprops minutus** n. sp. Oblongus, nitidus, fortiter punctatus, niger, antennis ad basin pedibusque pro parte rufis ; capite post oculos angulato ; thorace breve, lateraliter ad medium valde dilatato ; elytris postice parum dilatatis, sparse luteo pubescentibus. Long. 6 mill. Congo. — Voisin de *Buffeventi* Pic, moins pubescent, avec les tempes anguleuses et non subarrondies.

**L. robusticollis** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, fortiter et irregulariter punctatus, niger ; thorace lato, lateraliter ad medium valde dilatato ; elytris parum elongatis, dense punctatis, pro parte plicatis. Long. 12 mill. Sumatra. — Par sa forme, voisin de *forticornis* Frm., plus foncé, prothorax non caréné, mais à dépression médiane, pattes plus foncées.

**Pengaleuganus testaceicornis** n. sp. Oblongo-elongatus, dense ruguloso-punctatus, rufescens, thorace lateraliter elytrisque apice pallidioribus, membris testaceis ; thorace lateraliter undulato, postice dentato et emarginato. Long. 8 mill. Ile Kei. — Plus étroit que *inæqualis*, prothorax différent, antennes testacées au lieu d'être noires.

**P. angustatus** n. sp. Oblongo- elongatus, niger, antennis pedibusque late nigris, thorace lateraliter parum undulato. Long. 7 mill. Ile Kei. — Peut-être simple var. du précédent.

**Anædus rufipes** n. sp. Oblongus, nitidus, piceo-subænescens, antennis ad basin, palpis pedibusque rufis; thorace ad medium angustato-dilatato, fortiter sat dense punctato; elytris latis, satis brevibus, postice attenuatis, dense punctatis aut plicatis. Long. 7 mill. Guyane. — A placer près de *geniculatus* Pic.

**Paratenetus limbaticollis** n. sp. Satis elongatus, nitidus, pubescens, nigro-piceus, thorace lateraliter elytrisque rufescentibus. Long. 5 mill. Brésil. — Voisin de *luridus* Mots., mais avec la ponctuation des élytres moins forte, plus espacée que celle du prothorax et la coloration différente.

**P. suturalis** n. sp. Oblongus, antice et postice attenuatus, nitidus, niger, pro parte brunnescens, antennis ad basin, pedibus elytrisque rufis, his ad suturam antice nigro notatis. Long. 4 mill. Brésil. — Voisin de *grandis* Pic, prothorax plus transversal, élytres plus courts et non entièrement roussâtres.

**P. lithophiloides** n. sp. Robustus, nitidus, rufus, antennis apice nigris; capite thoraceque dense punctatis, illo subcordiforme, lateraliter crenulato; elytris latis et brevibus, antice depressis, sparse et antice fortiter punctatis. Long. 2,5 mill. Brésil. — Très distinct par sa forme qui copie un peu le genre *Lithophilus* Fr.

**Ceropria opacipennis** n. sp. Oblongo-elongatus, depressus, subopacus, brunnescens, pedibus pallidioribus, minute punctatus; elytris mediocre striato-punctatis, intervallis deplanatis, fere impunctatis. Long. 10-11 mill. Chine. — Espèce reconnaissable, à première vue, par son aspect mat et sans reflets métalliques.

**C. Baeri** n. sp. Oblongus, subænescens, parum nitidus, rufescens, pectore pro parte, capite postice thoraceque in disco piceis, capite antice, palpis, antennis ad basin, geniculis tarsisque pro parte testaceis. Long. 9 mill. Iles Philippines. — Très voisin du précédent, un peu brillant, moins allongé, prothorax plus arqué sur les côtés et plus ponctué, etc.

**C. gabonica** n. sp. Oblongus, convexus, nitidus, niger, thorace elytrisque viridi-subæneis, femoribus rufis; thorace minutissime punctato; elytris fortiter striato-punctatis, intervallis convexis, parum et minutissime punctatis. Long. 10 mill. Gabon. — Voisin de *ruficrus* Geb., mais antennes entièrement foncées et sculpture élytrale différente.

**C. parumpunctata** n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, rufescens, capite postice, elytris pro parte, antennis pedibusque pro majore parte piceis; thorace minutissime punctato; elytris minute striato-punctatis, intervallis deplanatis, minute punctatis. Long. 9 mill. Afrique Or. — Peut se placer près de *anthracina* Qued., forme moins allongée, coloration moins foncée, ponctuation des stries plus fine.

**C. 4-plagiata v. nov. rufipes.** Supra viridescens, elytris rufo maculatis, macula postice elongata, antennis ad basin, pedibus et infra corpore pro parte rufis. Ceram.

**C. subnigra v. nov. Martini.** Coloration générale roussâtre avec les pattes testacées. Ceram.

**Heterophyllus convexus** n. sp. Oblongus, convexus, fortiter punctatus, nigro-subænescens, capite antice, thorace pro parte lateraliter antennisque ad basin rufis; elytris antice et postice testaceo notatis. Long. 2,5 mill. Tananarive. — A placer près de *curtus* Frm.

**H. ruficeps** n. sp. Subovatus et curtus, convexus, thorace elytrisque fortiter punctatis, niger, capite, illo pro parte alutaceo, antennis, pedibus pectoreque rufis. Long. 2 mill. Tananarive. — Sans doute voisin de *minutus* Br.

**H. Sikorai** n. sp. Subovatus, nitidus, sparse punctatus, plus minusve rufus, capite postice, elytris et infra corpore nigris. Long. 2,5-3 mill. Madagascar. — Voisin de *similis* Chat.

**Toxicum angustatum** n. sp. Elongatus, opacus, pa-

rum punctatus, niger; ♂ clypeo cornu apice dilatato et truncato munito et capite ad oculos arcuato cornuto, cornu apice fulvo piloso; ♀ capite simplice, ad oculos carinato. Long. 15-18 mill. Chine. — Très voisin de *tricornutum* Wat., mais tête plus allongée, émoussée en avant, élytres à stries indistinctes.

**T. bicornutum** n. sp. ♂. Elongatus, opacus, diverse punctatus, niger; capite irregulariter et diverse punctato, antice arcuato impresso, postice excavato, ad oculos cornu glabro munito; thorace transverso, lateraliter sinuato, mediocre punctato, elytris minute striato punctatis. Long. 13 mill. Yunnan. — A placer près de *sumatrense* Frm., tête différente, angles antérieurs du prothorax plus avancés, etc.

**Epicalla superba** n. sp. Oblongus, postice dilatatus, viridi-ænescens, pro parte cupreo tinctus, antennis nigro-cyaneis, elytris minute striato-punctatis, cupreis, maculis viridibus, irregulariter ornatis. Long. 14 mill. Brésil. — Jolie espèce très distincte par ses élytres ornés de macules verdâtres, en partie impressionnées, celles-ci plus ou moins grosses et irrégulièrement disposés.

**E. instriata** n. sp. Oblongus, postice dilatatus, viridis, pro parte cupreo tinctus, supra olivaceus, antice vage cupreo maculatus; antennis satis brevibus, crassis; thorace transverso, lateraliter fere recte, sparse punctato, postice lateraliter impresso; elytris minute lineato-punctatis, intervallis pro parte elevato sub-carinatis; pedibus elongatis. Long. 16 mill. Panama. — A placer près de *lata* Chp.

**E. Gounellei** n. sp. Oblongus, æneus, elytris viridibus, antennis nigro-cyaneis; thorace transverso; elytris subparallelis, fortiter striatis. Long. 11 mill. — Brésil. — Voisin de *varipes* Chp. et distinct, à première vue, par les membres foncés.

**E. testaceicornis** n. sp. Très voisin du précédent, mais un peu plus étroit, avec les pattes et le sommet

de l'abdomen teintés de roux, les antennes testacées. Long. 10 mill. Brésil.

**E. ænescens** n. sp. Oblongo-elongatus, ænescens, antennis nigro-cœruleis; thorace transverso, fortiter et dense punctato, postice impresso; elytris subparallelis, fortiter striatis, antice impressis. Long. 10-11 mill. Brésil.

**E. Leseleuci** n. sp. Oblongus, sed latus, viridis aut æneus, pro parte in thorace et in elytris purpureo-tinctus, pedibus pro parte cupreis, antennis nigro-cœruleis. Long. 12 mill. Amérique M^le^. — Très distinct des précédents par les élytres plus larges et nettement élargis postérieurement.

**E. inæqualis** n. sp. Oblongus, ænescens; thorace transverso, in disco multiimpresso; elytris postice paulo dilatatis, inæqualiter et pro parte sinuato-striatis, intervallis pro parte subgibbosis. Long. 6 mill. Caracas. — Espèce très distincte, entre toutes, par sa sculpture élytrale.

**E. lineata** n. sp. Elongatus, rufo-cupreus et viriditinctus, elytris lineis purpureis aut viridescentibus alternatis, his fere parallelis et minute striato-punctatis. Long. 8 mill. Brésil.

**Ectomopsis Augustalisi** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, supra ænescens, elytris æneo-cupreis, his fere instriatis et minute lineato punctatis, intervallis deplanatis, fere lævibus; thorace breve, lateraliter sinuato, sat fortiter punctato, angulis antice fere rectis. Long. 6 mill. Brésil. — Diffère, à première vue, de *Bruchi* Frm., par la coloration et la forme du prothorax.

**Pseudeumolpus Rouyeri** n. sp. Oblongus, niger, capite postice thoraceque viridibus, elytris viridi-purpureis, minute striato-punctatis, antennis pedibusque rufis. Long. 10 mill. Java. — Voisin de *purpureipennis* Pic, mais élytres avec des traces de stries et pattes rousses.

**P. semiviolaceus** n. sp. Oblongus, niger, elytris violaceis aut cœruleo-violaceis, minute striatis et fortiter punctatis. Long. 11-12 mill. Birmanie. — A placer près du précédent.

**Hemicera foveolata** n. sp. Oblongus, antice attenuatus, nitidus, nigro-viridescens, supra æneus; thorace minute et sparse punctato, postice biimpresso; elytris irregulariter foveolatis. Long. 12 mill.: Madura. — Espèce très distincte par sa sculpture élytrale.

**H. Theresæ** n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, atro-cœruleus, elytris viridibus, lineato purpureis et violaceo lineato-punctatis, his instriatis. Long. 12 mill. Chine. — Jolie espèce, très distincte par sa coloration; peut se placer près de *alternata* Geb.

**H. Dohertyi** n. sp. Oblongo-elongatus, viridi-cœruleus, elytris aurichalceis, violaceo-striatis, striis parum punctatis. Long. 13 mill. Malacca. — Voisin de *semicyaneus* Kr., coloration différente, épistome peu échancré.

**H. femoralis** n. sp. Oblongus, cyaneus, elytris purpureis et violaceo tinctis, ad suturam et lateraliter cyaneis, minute striatis, femoribus late rufis. Long. 10 mill. Java. — A placer près de *Lisæ* Kr.

**H. niasensis** n. sp. Oblongus, postice dilatatus, viridis, elytris purpureis, minute striatis. Long. 11 mill. Ile Nias. — Diffère du précédent par les élytres un peu plus longs et la coloration différente.

**H. humeralis** n. sp. (1). Très voisin du précédent, plus robuste, élytres à suture verte et macule humérale bleue, prothorax plus nettement ponctué. Long. 8 mill. Ile Nias.

**H. humeralis v. nov. semiænea.** Minutus, cœruleus, elytris æneis. Bornéo.

(1) Cette espèce et d'autres de petite taille peuvent rentrer dans un s.-genre nouveau que je nomme *Microhemicera* caractérisé surtout par l'épistome presque droit, ou à peine échancré.

**H. minuta** n. sp. Oblongo-ovatus, convexus, viridi-cœruleus, thorace postice scutelloque violaceis, elytris viridibus, lateraliter paulo cupreis, convexis, minute striatis. Long. 8 mill. Ile Banguey. — Voisin du précédent et distinct, à première vue, par la forme bombée des élytres.

**H. bicoloripes** n. sp. Oblongo-elongatus, antice et postice attenuatus, multicolor, pro parte cupreus, pro parte æneus et diverse viride aut violaceo tinctus, elytris cupreis, ad suturam et lateraliter viridibus, in disco violaceo-purpureo lineatis, humeris violaceis, femoribus late rufis. Long. 11 mill. Balabac. — Jolie espèce, distincte par sa forme, jointe à sa coloration, pouvant prendre place près de *caudata* Geb.

**H. cyaneocincta** n. sp. Oblongo-elongatus, cyaneo-violaceus, elytris æneis, vage cupreo lineatis, lateraliter cœruleo marginatis, his minute striatis; thorace postice impresso, vage punctato. Long. 10 mill. Ile Banguey. — A placer près de *Lisæ* Kr.

**Sycophantes** (1) **substriatus** n. sp. De forme oblongue allongée avec les rangées de fovéoles des élytres réunies longitudinalement par une petite strie. Long. 12 mill. — Reçu du frère Apollinaire-Marie.

**S. instriatus** n. sp. De forme oblongue avec les élytres moins surélevés au milieu, ornés de fovéoles non réunies par des stries. Long. 7 mill. Antioquia.

**Isicerdes subparallelus** n. sp. Elongatus, subparallelus, niger, elytris vage ænescentibus; thorace transverso, sat fortiter et sparse punctato; elytris mediocre striatis et sat fortiter lineato-punctatis. Long. 7 mill. Guyane Française. — A placer près de *funebris* Chp.

**I. niger** n. sp. Très voisin du précédent, mais entièrement noir avec les élytres plus fortement striés et

(1) Cette espèce et la suivante ont de commun les élytres fovéolés-ponctués, une coloration noire avec les membres roux, elles sont originaires de Colombie.

ponctués et le prothorax nettement ondulé sur les côtés. Long. 7-8 mill. Brésil (1).

Très voisin du précédent est l'espèce brésilienne *semiopacus* mihi, qui en diffère par l'avant-corps presque mat, plus fortement ponctué avec les angles postérieurs du prothorax fortement rebordés, les élytres un peu plus larges et à plus grosse ponctuation.

**I. lineatopunctatus** n. sp. Elongatus, subparallelus, niger, elytris fortiter lineato-punctatus. Long. 7 mill. Brésil. — Cette espèce se distingue, à première vue, par les élytres dépourvus de stries distinctes et ornés de rangées de points fovéolés en partie allongés.

Très voisin du précédent est le *biimpressus* mihi, de Colombie, dont les points fovéolés des élytres sont plus écartés, tandis que le prothorax a les angles antérieurs un peu avancés et est orné de deux impressions postérieures discales.

**I. semiæneus** n. sp. Elongatus, nigro-metallicus, elytris æneis; thorace transverso, lateraliter subarcuato et minute undulato; elytris sat fortiter striato-punctatis. Long. 5 mill. Brésil. — Espèce très distincte par sa coloration.

**? I. foveolatus** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, parum convexus, niger, thorace ad medium dilatato, sat fortiter et parum dense punctato; elytris sat regulariter foveolatis. Long. 8 mill. Bolivie. — Espèce très distincte des autres par la forme du prothorax et le dessus plus convexe.

**Choastes elongatus** n. sp. Elongatus, subparallelus, niger; thorace transverso, sinuato, parum et sparse punctato; elytris mediocre striatis, sat fortiter lineato-punctatis. Long. 8 mill. Brésil. — Voisin de *angulicollis* Chp., distinct, à première vue, par sa forme allongée.

(1) La var. nov. *subnitidus*, du Brésil, est peu brillante avec le prothorax un peu déprimé et les élytres offrent une ponctuation plus écartée.

**C. rufonotatus** n. sp. Oblongus, niger, thorace lateraliter antice rufo notato, elytris nigro-cupreis; thorace multiimpresso et sat sparse punctato; elytris satis brevibus, fortiter striato-punctatis. Long. 7 mill. Guyane Française. — Moins allongé que le précédent et non entièrement noir.

**C. multiimpressus** n. sp. Oblongus, niger, subopacus, elytris subæneis, nitidis, longe punctato-impressis; thorace lateraliter sinuato, multi impresso. Long. 5 mill. Brésil. — Espèce très distincte par sa sculpture.

---

TABLE

POUR LE TRENTE-QUATRIÈME FASCICULE

Page

Nouveautés diverses . . . . . 1

LES IMPRIMERIES RÉUNIES, MOULINS